

2013年1月(記載要領変更に伴う改訂)

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

かゆみ・炎症に  
**ピカ1S**  
非ステロイド剤

第3類医薬品

#### 製品の特長

本剤は、抗ヒスタミン剤ジフェンヒドラン塩酸塩を2%配合し、*d*-カンフル、*l*-メントール、サリチル酸メチルの爽快な刺激感と共に、かゆみ、湿疹などの炎症症状を軽減いたします。副作用の気になるステロイド剤は配合しておりません。

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
(1)医師の治療を受けている人。  
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。  
(3)湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
- | 関係部位 | 症 状          |
|------|--------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

#### 使用上の注意

#### 【効能・効果】

かゆみ止め、かぶれ、しもやけ、あせも、湿疹、皮膚炎、じんましん

#### 【用法・用量】

用いのにぞみ、1日数回患部に塗布又はすりこんでください。

#### 【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。  
(2)目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。  
(3)外用にのみ使用してください。

#### 【成分・分量】 1g中

成 分 名	分量	作 用 等
ジフェンヒドラン塩酸塩	20mg	抗ヒスタミン作用により、発赤、かゆみなどの炎症症状を取り除きます。
トコフェロール酢酸エステル	5mg	末梢の血流を改善し、患部の修復を早めます。
グリチルレチン酸	1mg	非ステロイド性の抗炎症作用により、炎症症状を軽減します。
サリチル酸メチル	20mg	局所深部を刺激して血流を改善し、炎症に伴う痛みを軽減します。
<i>l</i> -メントール	50mg	局所の知覚を鈍麻し、痛み、かゆみを抑えます。
<i>d</i> -カンフル	20mg	局所を刺激して血行を改善し、痛み、かゆみを取り除きます。

添加物：ステアリン酸、セタノール、流動パラフィン、プロピレングリコール、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、スクワラン、ポリソルベート80、ラウリル硫酸Na、水酸化K

#### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓して保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)  
(4)配置期限(外箱記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡ください。

新生薬品株式会社 消費者相談窓口 [9:00～17:00(土、日及び祝日を除く。)]

〒930-0364 富山県中新川郡上市町横越16番1 電話番号(076)472-0361

発売元 **第一薬品工業株式会社** 富山県富山市草島15-1

製造販売元 **新生薬品株式会社** 富山県中新川郡上市町横越16番1

SNO