

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

漢方製剤

# ハ味丸

(ハチミガン)

第2類医薬品

## ⚠️ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。

### 👤 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)、軽い尿漏れ

## 用法・用量

次の量を、食前又は食間に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	12丸	3回
7才以上15才未満	8丸	
7才未満	服用させないこと	





- 食前とは、食事の1時間から30分位前のことです。
- 食間とは、食事のあと、2時間位たったときのことです。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(裏面もお読みください。)

成分・分量 36丸(成人1日量)中

成 分	分 量	基 原
 ジオウ末	1000mg	ゴマノハグサ科の多年草アカヤジオウ又はカイケイジオウの根をそのままあるいは蒸して薬用にします。
 サンシュユ末	580mg	ミズキ科の落葉小高木サンシュユの熟した果実（偽果）から種子を抜きとった果肉です。
 サンヤク末	580mg	ヤマノイモ科の多年草ヤマノイモ又はナガイモの外皮を剥いだ根茎をそのままあるいは蒸して薬用にします。
 タクシャ末	580mg	オモダカ科の多年生水草サジオモダカの塊茎を薬用にします。
 ブクリョウ末	580mg	アカマツ又はクロマツを切り倒してから3～4年を経た土中の根に寄生するサルノコシカケ科の菌核（マツホド）を乾燥したものです。
 ボタンピ末	580mg	ボタン科の落葉低木ボタンの根の皮を薬用にします。
 ケイヒ末	330mg	クスノキ科の常緑高木であるクスノキ属植物の木の幹や枝の皮を薬用にします。
 ブシ末	100mg	キンポウゲ科の多年草トリカブト属植物の塊根（ <sup>フ</sup> 附 <sup>シ</sup> 子、烏頭）を加工処理したものです。

添加物としてトウモロコシデンプン、デヒドロ酢酸Na、寒梅粉、ハチミツ、マクロゴール、ナタネ油、タルクを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)容器内の詰め物は、輸送中の丸剤破損防止用です。容器のキャップを開けた後は捨ててください。
- (5)表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口：電話 076-435-5055  
午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**  
富山市草島15-1