

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

目薬

第一ゴールド目薬

第2類医薬品

第一ゴールド目薬は、目の炎症をしずめて充血やかゆみなどの症状を改善したり、目の疲れをとる働きがあります。ほこりっぽい場所で作業した後の目のかゆみ・かすみ、目を酷使したときの疲れ目などにおすすめします。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 次の症状のある人。
はげしい目の痛み
 - 次の診断を受けた人。
緑内障

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 目のかすみが改善されない場合。
 - 5～6日間使用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

（裏面もお読みください。）

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴ずつを点眼してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させていただきます。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。


成分・分量

100mL中

成分	分量	はたらき
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管を収縮する作用により、目の充血を取り除きます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	2mg	目の調節神経に作用して、ピント調節をスムーズにし、目の疲れを改善します。
アラントイン	100mg	炎症症状（かゆみ・充血）などを鎮めます。
グリチルリチン酸二カリウム	100mg	抗アレルギー作用・抗炎症作用により、紫外線が原因の眼炎や眼瞼炎の炎症を鎮め、目のかゆみを抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	10mg	抗ヒスタミン作用により、アレルギー性の目のかゆみや炎症を抑えます。
ピリドキシン塩酸塩	100mg	目の組織代謝を活発にすることで、目の疲れを改善します。

添加物としてホウ酸、ホウ酸Na、ベンザルコニウム塩化物、pH調整剤、l-メントール、d-カンフル、エタノールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所（40℃以上）に放置しないでください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 表示の期限を過ぎたものは使用しないでください。また、表示の期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

■お問い合わせ先

くすり相談窓口：電話 076-435-5055
午前9時から午後4時30分まで
(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **第一薬品工業株式会社**
富山市草島15-1