

この説明文書は、ご使用前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鎮痒消炎薬

ヒフダイヤG

第②類医薬品

【特長】

- ・ コルチゾン酢酸エステル(副腎皮質ホルモン)とグリチルレチン酸配合の外用鎮痒・消炎薬で、発赤、発熱、はれの症状(炎症)をはやくおさえます。
 - ・ 炎症の初期は、かゆみを伴います。
クロタミトンは、抗ヒスタミン薬や局所麻酔薬と異なり、かゆみ以外の皮膚感覚に影響を与えず鎮痒効果を発揮します。
 - ・ 患部を搔くと症状が悪化し、細菌に感染しやすくなります。
イソプロピルメチルフェノールは、この細菌による二次感染を防ぎます。
 - ・ クリームタイプでのびがよく、べたつきがなくさっぱりしているので衣類などを汚すこともありません。
- また、皮膚への浸透性がよいので、すみやかに作用し、優れた効果が期待できます。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の部位には使用しないでください
水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部。
2. 顔面には、広範囲に使用しないでください
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 患部が広範囲の人。
(5) 湿潤やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感
皮膚(患部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(裏面もお読みください。)

効能・効果

湿疹、皮膚炎、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日2～3回 適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)用法を守ってください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)外用にのみ使用してください。

成分・分量 100g中

成分	分量
コルチゾン酢酸エステル	0.5g
トコフェロール酢酸エステル	0.5g
クロタミトン	5.0g
グリチルレチン酸	0.5g
イソプロピルメチルフェノール	0.3g

添加物としてプロピレングリコール、セタノール、ミリスチン酸イソプロピル、ラウリル硫酸Na、ステアリン酸ソルビタン、エドト酸Na水和物、パラベン、香料、ステアリン酸グリセリン、ペヘン酸、ヘキシルデカノール、スクワラン、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸ポリオキシル、ラウロマクロゴールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
特に高温になるような所（夏の車中など）には絶対に保管しないでください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります）。
- (4)表示の期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、表示の期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。

お問い合わせ先

中新薬業株式会社 お客様相談室

電話 076-475-2121

受付時間 9:00～16:00（土、日、祝日を除く）

発売元 **第一薬品工業株式会社** 富山県富山市草島15-1

製造販売元 **中新薬業株式会社** 富山県滑川市上小泉504-2