

清痛顆粒

項目	内容
医薬品区分	一般配置兼用医薬品
薬効分類	解熱鎮痛薬
製品名	清痛顆粒
製品名(読み)	セイツウカリユウ
製品の特徴	清痛顆粒は、解熱鎮痛成分アセトアミノフェン、エテンザミドに、疼痛を緩和する漢方処方に用いられている生薬の「芍薬」と「甘草」のエキスを加えた解熱鎮痛薬です。頭痛、歯痛、生理痛、肩こり痛、腰痛、神経痛などのさまざまな痛みに、また不意の発熱に、すばやく効きめをあらわします。
使用上の注意	<p>■してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)</p> <ol style="list-style-type: none">次の人は服用しないでください (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。 (2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください 他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬、乗物酔い薬服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください (眠気等があらわれることがあります。)服用前後は飲酒しないでください長期連用しないでください <p>■相談すること</p> <ol style="list-style-type: none">次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)水痘(水ぼうそう)もしくはインフルエンザにかかっている又はそ

の疑いのある乳・幼・小児(15才未満)。

(4)高齢者。

(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(6)次の診断を受けた人。

心臓病, 腎臓病, 肝臓病, 胃・十二指腸潰瘍

2. 服用後, 次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので, 直ちに服用を中止し, この説明書を持って医師, 薬剤師又は登録販売者に相談してください

[関係部位: 症状]

○皮膚: 発疹・発赤, かゆみ

○消化器: 吐き気・嘔吐, 食欲不振

○精神神経系: めまい

○その他: 過度の体温低下

まれに次の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

[症状の名称: 症状]

○ショック(アナフィラキシー): 服用後すぐに, 皮膚のかゆみ, じんましん, 声のかすれ, くしゃみ, のどのかゆみ, 息苦しさ, 動悸, 意識の混濁等があらわれる。

○皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群), 中毒性表皮壊死融解症, 急性汎発性発疹性膿疱症: 高熱, 目の充血, 目やに, 唇のただれ, のどの痛み, 皮膚の広範囲の発疹・発赤, 赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る, 全身がだるい, 食欲がない等が持続したり, 急激に悪化する。

○薬剤性過敏症症候群: 皮膚が広い範囲で赤くなる, 全身性の発疹, 発熱, 体がだるい, リンパ節(首, わきの下, 股の付け根等)のはれ等があらわれる。

○肝機能障害: 発熱, かゆみ, 発疹, 黄疸(皮膚や白目が黄色くなる), 褐色尿, 全身のだるさ, 食欲不振等があらわれる。

○腎障害: 発熱, 発疹, 尿量の減少, 全身のむくみ, 全身のだるさ, 関節痛(節々が痛む), 下痢等があらわれる。

○間質性肺炎: 階段を上ったり, 少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる, 空せき, 発熱等がみられ, これらが急にあらわれたり, 持続したりする。

○ぜんそく: 息をするときゼーゼー, ヒューヒューと鳴る, 息苦しい等があらわれる。

	<p>3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p> <p>眠気</p> <p>4. 5～6 回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください</p>																								
効能・効果	<p>1) 頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛</p> <p>2) 悪寒・発熱時の解熱</p>																								
用法・用量	<p>次の量を、なるべく空腹時をさけて服用してください。</p> <p>[年齢:1 回量:1 日服用回数]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 成人(15 才以上):1 包:6 時間以上の間隔をおいて 2 回まで ○ 11 才以上 15 才未満:2/3 包:6 時間以上の間隔をおいて 2 回まで ○ 7 才以上 11 才未満:1/2 包:6 時間以上の間隔をおいて 2 回まで ○ 3 才以上 7 才未満:1/3 包:6 時間以上の間隔をおいて 2 回まで ○ 3 才未満:服用させないこと 																								
用法関連注意	<p>(1)用法・用量を厳守してください。</p> <p>(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。</p>																								
成分分量	<p>2 包(3.2g)(成人 1 日 2 回量)中</p> <table border="1" data-bbox="427 1391 1139 1854"> <thead> <tr> <th>成分</th> <th>分量</th> <th>内訳</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アセトアミノフェン</td> <td>600mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>エテンザミド</td> <td>1000mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブロモバレリル尿素</td> <td>180mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無水カフェイン</td> <td>90mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ビスベンチアミン</td> <td>10mg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>カンゾウエキス末</td> <td>140mg</td> <td>(カンゾウ 980mg)</td> </tr> <tr> <td>シャクヤクエキス</td> <td>140mg</td> <td>(シャクヤク 700mg)</td> </tr> </tbody> </table>	成分	分量	内訳	アセトアミノフェン	600mg		エテンザミド	1000mg		ブロモバレリル尿素	180mg		無水カフェイン	90mg		ビスベンチアミン	10mg		カンゾウエキス末	140mg	(カンゾウ 980mg)	シャクヤクエキス	140mg	(シャクヤク 700mg)
成分	分量	内訳																							
アセトアミノフェン	600mg																								
エテンザミド	1000mg																								
ブロモバレリル尿素	180mg																								
無水カフェイン	90mg																								
ビスベンチアミン	10mg																								
カンゾウエキス末	140mg	(カンゾウ 980mg)																							
シャクヤクエキス	140mg	(シャクヤク 700mg)																							
添加物	<p>果糖, セルロース, カルメロースカルシウム(CMC-Ca), メタケイ酸アルミン酸マグネシウム, 乳糖, タルク, クロスカルメロースナトリウム(クロス CMC-Na), ヒドロキシプロピルセルロース, カラメル, 無水ケイ酸</p>																								

保管及び取扱い上の注意	<p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。</p> <p>(2)小児の手の届かない所に保管してください。</p> <p>(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)</p> <p>(4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。</p> <p>(5)表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。</p>
消費者相談窓口	<p>会社名:第一薬品工業株式会社</p> <p>問い合わせ先:くすり相談窓口</p> <p>電話:076-435-5055</p> <p>受付時間:午前9時から午後4時30分まで(土,日,祝日を除く)</p>
製造販売会社	<p>第一薬品工業株式会社</p> <p>〒931-8515 富山県富山市草島 15-1</p>
剤形	<p>散剤</p>
リスク区分等	<p>第「2」類医薬品</p>