

2012年3月(記載要領変更に伴う改訂)

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 目薬 アイルビーナS

第3類医薬品

アイルビーナSには、年齢とともに低下する目の調節機能を改善したり、炎症を抑えてかゆみや充血をとり除く成分が配合されています。目の疲れやかゆみ、かすみなどの症状にお役立てください。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

##### 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。  
    はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人。  
    緑内障

##### 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

##### 3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 目のかすみが改善されない場合。
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

### 効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目にに入ったときなど）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼瞼炎（まぶたのただれ）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ（目やにの多いときなど）

（裏面もお読みください。）

## 用法・用量

1日3~6回、1回1~3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (4) 点眼用にのみ使用してください。

## 成分・分量 100mL中

成 分	分 量
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg
イブシロンーアミノカプロン酸	1000mg
グリチルリチン酸二カリウム	50mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg
酢酸d-α-トコフェロール	50mg
タウリン	100mg
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	100mg

添加物としてホウ酸、クロロブタノール、パラベン、I-メントール、d-ボルネオール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 表示の期限を過ぎたものは使用しないでください。また、表示の期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

## お問い合わせ先

くすり相談窓口：電話 (076) 435-5055  
午前9時から午後4時30分まで（土、日、祝日を除く）

製造販売元 第一薬品工業株式会社

富山市草島15-1

NK-BC-10