

この説明書は、ご使用の前に必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

ビタミン含有保健剤

ハダビタン®C

指定医薬部外品

ハダビタンCには、日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防に効果を発揮する、ビタミンB群（ビタミンB₂・B₆）、ビタミンC及びヨクイニンエキスを配合しています。

水なしでもさっと溶けるオレンジ風味の顆粒です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感、胃部膨満感、食欲不振、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

3. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

- 体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善
- 疲労の回復・予防
- 虚弱体質（加齢による身体虚弱を含む。）に伴う身体不調の改善・予防
- 日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防
 - ◆ 疲れやすい、疲れが残る、体力がない、身体が重い、身体がだるい
 - ◆ 肌の不調（肌荒れ、肌の乾燥）
 - ◆ 骨又は歯の衰え
- 病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

（裏面もお読みください。）

用法・用量

次の量を服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	1回
15才未満	服用させないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守してください(他のビタミン等を含有する製品を同時に使用する場合には過剰摂取等に注意してください。)。

成分・分量 1包(成人1日量)中 (1包:1000mg)

成 分	分 量
アスコルビン酸(ビタミンC)	500mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	10mg
リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2酪酸エステル)	12mg
ヨクイニンエキス	80mg (ヨクイニンとして 1040mg)

添加物としてD-マンニトール、トウモロコシデンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、スクラロース、二酸化ケイ素、エタノール、香料、バニリンを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

- (1) 本剤の服用により、尿及び大便の検査値に影響を与えることがあります。
これらの検査を受ける場合は、ビタミンCを含有する製剤を服用していることを医師にお知らせください。
- (2) 本剤はリボフラビン酪酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。
- (4) 表示の期限を過ぎたものは服用しないでください。

お問い合わせ先

くすり相談窓口：電話 076-435-5055

午前9時から午後4時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 第一薬品工業株式会社

富山市草島15-1

®：登録商標